

S'occuper de son chat après une chirurgie du radius et de l'ulna

La clinique AniCura TRIOVet a réalisé une chirurgie pour traiter une fracture du radius et de l'ulna. Cette chirurgie implique de remettre en place les fragments et de le stabiliser au moyen d'un fixateur externe. La durée nécessaire pour le développement de ce tissu cicatriciel se situe entre 10 et 12 semaines.

La grande majorité des chats se sentiront suffisamment bien pour faire de l'exercice. Il est de votre responsabilité de les en empêcher tout au long de la cicatrisation et jusqu'au feu vert d'un vétérinaire pour augmenter le niveau d'activité.

Activité

Aucun implant ne supporterait un exercice intense. Il est alors très important de **respecter les consignes de restriction d'activité** pendant la phase de cicatrisation :

- Le trot expose le membre opéré à des forces doubles et deux fois plus fréquentes que lors de la marche. Courir et sauter augmente les forces sur le membre opéré de 5 à 10 fois avec un risque accru d'échec des implants (plaque/vis)
- Eviter les surfaces glissantes et les escaliers qui peuvent générer un stress important sur les implants.
- Dans la plupart des cas, le meilleur moyen d'éviter tous ces mouvements est de confiner votre chat **dans une cage** de taille adaptée.

À quoi s'attendre ?

- Votre chat devrait avoir un niveau de confort satisfaisant dès que vous le récupérez. La plupart des chats utilisent le membre opéré dans les 7-10 jours suivant la chirurgie.

- Nous espérons une **amélioration progressive** des signes cliniques s'étalant sur quelques semaines avec un retour à une démarche normale lors d'exercice normal espéré 2 à 3 mois après la chirurgie.
- La récupération fonctionnelle peut cependant parfois s'étaler sur une période plus longue et des séquelles peuvent parfois persister suite au développement irrémédiable d'arthrose.
- La plupart des animaux sont capables d'uriner sans aide particulière lorsqu'ils rentrent à la maison (24-48heure après leur retour au moins). La grande majorité des chats ne présentent aucune difficulté pour déféquer bien que le **transit puisse prendre quelques jours (5-7 jours) avant de reprendre**.



Traitement médical

- La clinique AniCura TRIOVet vous délivrera une ordonnance indiquant tous les traitements nécessaires ainsi que la durée

Gestion de la plaie chirurgicale

- **Gardez la plaie propre et sèche.** Contactez la clinique AniCura TRIOVet ou votre vétérinaire traitant en cas d'anomalie.

- Le point d'entrée des broches doit être contrôlé quotidiennement. Un léger suintement peut être normal, mais une production excessive de sérosités doit mener à une visite de contrôle chez un vétérinaire.



Visites de suivi

- Des sutures sont en place sur la plaie chirurgicale. Elles devront être retirées **10-15 jours** après la date de la chirurgie. Cela peut être réalisé chez votre vétérinaire traitant habituel.
- Un rendez-vous de suivi 6 semaines après la chirurgie est nécessaire. Des radiographies devront être réalisées sous sédation dans le but de contrôler la bonne position des implants et la poursuite d'une cicatrisation satisfaisante. Veillez à amener votre animal à jeûn depuis la veille au soir le jour de ce contrôle.
- Le fixateur externe pourra être retiré une fois la consolidation osseuse confirmée radiographiquement. Cela peut se faire sous sédation. Veillez à amener votre animal à jeûn depuis la veille au soir le jour de ce contrôle.
- Des rendez-vous de suivi peuvent être recommandés toutes les 4-6 semaines, si nécessaire. TRIOVet et moi-même restons à votre disposition pour toute question ou si vous ou votre vétérinaire souhaitez que nous réexaminions votre chat.

Complications possibles

Les complications les plus fréquemment décrites suite au traitement chirurgical fracture du radius et de l'ulna sont:

- Une infection post-opératoire. Le taux est faible et la plupart des infections guérissent suite à une antibiothérapie adaptée.
- Le développement d'une infection sur le site d'insertion des broches du fixateur externe est possible. Cela peut mener à l'instabilité du montage. Un traitement local de nettoyage voire un traitement antibiotique peuvent être nécessaires. Le remplacement d'une partie du montage peut parfois être nécessaire.
- En cas d'activité trop importante et trop précoce, les implants peuvent ne pas réussir à maintenir les bouts osseux en place auquel cas il faudra réopérer pour restabiliser la fracture.
- La radiographie de contrôle à 6 semaines permet d'évaluer la cicatrisation osseuse. Une non-union ou une union retardée peuvent mener à la nécessiter de répéter le contrôle radiographique à 12 semaines et/ou d'envisager une greffe osseuse.