

S'occuper de son chat après une chirurgie

La clinique AniCura TRIOVet a réalisé une chirurgie pour traiter une hernie diaphragmatique. La durée de récupération est rapide. Ainsi, la plupart des chats une respiration normale au moment du retour à la maison.



A quoi s'attendre ?

- Nous espérons une **amélioration rapide** des signes cliniques s'étalant sur quelques jours avec un retour à la normale espéré en quelques semaines après la chirurgie.
- La plupart des animaux sont capables d'uriner sans aide particulière lorsqu'ils rentrent à la maison (**émission d'urine volontairement au moins une fois par jour**). Si cela n'était pas le cas, des consignes spécifiques vous seront données au moment du retour à la maison.
- La grande majorité des chats ne présentent aucune difficulté pour déféquer bien que le **transit puisse prendre quelques jours avant de reprendre**.

Niveau d'activité recommandé

- Les sauts, courses, jeux et montées/descente d'escaliers doivent être proscrites pendant au minimum une semaine. Éviter les surfaces glissantes et les escaliers qui peuvent générer une tension importante sur la plaie.
- Dans la plupart des cas, le meilleur moyen d'éviter tous ces mouvements est de confiner votre animal **dans une cage** de taille adaptée.
- L'activité peut ensuite progressivement augmenter mais doit être discutée avec un vétérinaire au moment du retrait des sutures/agraves afin d'adapter spécifiquement la démarche au besoin de votre chat.

Traitement médical

La clinique AniCura TRIOVet vous délivrera une ordonnance indiquant tous les traitements nécessaires ainsi que la durée

Gestion de la plaie chirurgicale

Si un pansement est en place sur la plaie au moment du retour à la maison, il doit être conservé aussi longtemps que possible. Si le pansement venait à se décoller, il n'est pas nécessaire d'en replacer un nouveau : finissez de le décoller et garder la plaie propre et sèche.

Si la plaie est découverte, surveillez-la au moins une fois par jour. Contactez la clinique AniCura TRIOVet ou votre vétérinaire traitant en cas d'anomalie.

Le port d'une collerette est **obligatoire pendant deux semaines** afin de limiter au maximum le risque de complications de plaie (infection, retard de cicatrisation...). Un léchage unique de la plaie peut mener à une infection.



Visites de suivi

- Si votre chat est resté avec nous moins de 10-14 jours, des sutures ou agrafes seront toujours en place sur la plaie chirurgicale. Elles devront être retirées **2 semaines** après la date de la chirurgie. Cela peut être réalisé chez votre vétérinaire traitant habituel.
- Un rendez-vous de suivi toutes les 2 à 4 semaines est ensuite recommandé jusqu'à récupération complète ou stabilisation. Ces rendez-vous peuvent être réalisés chez votre vétérinaire traitant habituel ou à AniCura TRIOVet si besoin.
- La clinique AniCura TRIOVet et moi-même restons à votre disposition pour toute question ou si vous ou votre vétérinaire souhaitez que nous réexaminions votre chat.