

S'occuper de son chien après une amputation ostéosarcome

Vous venez de récupérer votre chien après une amputation dans le traitement d'un cancer osseux (ostéosarcome) au sein de la clinique AniCura TRIOVet. Veuillez lire attentivement cette fiche et suivre avec attention les consignes données ci-dessous.

Activité

La grande majorité des chiens se sentiront suffisamment bien pour faire de l'exercice. Il est de votre responsabilité de les en empêcher afin de garantir une cicatrisation cutanée satisfaisante et de limiter les chutes sur le côté opéré ce qui pourrait être douloureux.

Dans la plupart des cas, la meilleure solution est de confiner votre animal dans une cage de taille adaptée (ou une petite pièce pour les grands chiens) quand il est à la maison et de le garder en laisse courte lors des promenades.

Un accès facile à l'extérieur est recommandé afin de faciliter les promenades. Dans le cas où il serait nécessaire d'emprunter les escaliers, il est recommandé de porter votre chien.

L'activité peut ensuite progressivement augmenter mais doit être discutée avec un vétérinaire au moment du retrait des sutures/agraves afin d'adapter spécifiquement la démarche au besoin de votre chien.

A quoi s'attendre ?

Votre chien devrait avoir un niveau de confort satisfaisant dès que vous le récupérez. La plupart des chiens ou chats sont en effet capable de se déplacer sans assistance dans les 24-72h suivant la chirurgie.

Beaucoup d'animaux pourront montrer quelques signes d'anxiété et être un petit peu plus calme que d'habitude lors de leur retour à la maison. Tout cela est normal et devrait rentrer dans l'ordre sous 10-15 jours.

La plupart des animaux sont capables d'uriner sans aide particulière lorsqu'ils rentrent à la maison (24-48 heures après leur retour au moins). La grande majorité des chiens ne présentent aucune difficulté pour déféquer bien que le transit puisse prendre quelques jours (5-7 jours) avant de reprendre.



Traitement médical

La clinique AniCura TRIOVet vous délivrera une ordonnance au moment du retour à la maison indiquant tous les traitements nécessaires ainsi que la durée.

Gestion de la plaie chirurgicale

Si un pansement est en place sur la plaie au moment du retour à la maison, il doit être conservé aussi longtemps que possible. Si le pansement venait à se décoller, il n'est pas nécessaire d'en replacer un nouveau : finissez de le décoller et **gardez la plaie propre et sèche**.

Si la plaie est découverte, surveillez-la au moins une fois par jour. Contactez la clinique AniCura TRIOVet ou votre vétérinaire traitant en cas d'anomalie.

Le port d'une collerette est obligatoire afin de limiter au maximum le risque de complications de plaie (infection, retard de cicatrisation...) : un simple coup de langue sur la plaie peut mener à une infection.

Il est possible que la plaie suinte un peu les premiers jours : quelques gouttes seraient normales. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre vétérinaire traitant habituel en cas de doute sur l'état de la plaie chirurgicale.

Visites de suivi

Des sutures ou agrafes sont en place sur la plaie chirurgicale. Elles devront être retirées **2 semaines** après la date de la chirurgie. Cela peut être réalisé chez votre vétérinaire traitant habituel.

Une chimiothérapie est généralement recommandée suite à la chirurgie puisque c'est le seul traitement qui permettrait de rallonger la durée de vie, l'amputation ayant majoritairement un rôle antidouleur en plus de réduire la quantité de cellules tumorales présentes dans le corps. Le protocole le plus souvent prescrit consiste en 4 injections espacées de 3 semaines. Pour de plus amples informations, une consultation avec un vétérinaire du service de médecine interne de la clinique AniCura TRIOVet est recommandée en plus des conseils que le chirurgien ou votre vétérinaire traitant habituel aurait pu vous donner.

Des radiographies ou un scanner du thorax sont recommandées 3 mois après la chirurgie puis tous les 3 mois ensuite afin de détecter l'apparition éventuelle de métastases le plus tôt possible et d'adapter le traitement au mieux.

Des rendez-vous de suivi sont donc recommandés tous les 3 mois après la fin de la chimiothérapie. La clinique AniCura TRIOVet ainsi que le Dr. Vet. Caron restent à votre disposition pour toute question ou si vous ou votre vétérinaire souhaitez que nous réexaminions votre chien.

Complications possibles

Les complications les plus fréquemment décrites suite à une amputation sont les suivantes :

- Faible taux d'infection de plaie. Un traitement antibiotique est généralement suffisant pour amener la guérison.
- Le développement d'un sérome (liquide sous la plaie chirurgicale) est également possible, ce qui rétrocede sans traitement particulier en l'absence d'infection. Un pansement compressif peut être appliqué pour limiter la progression. La mise en place d'un drain sous cutané peut s'avérer nécessaire dans les cas les plus graves (rare).
- Douleur fantôme. Dans de très rares cas l'irritation des nerfs qui ont dû être sectionnés crée une douleur chronique. Dans ces cas, un traitement médical avec de la gabapentine par exemple peut être mis en place.