

# S'occuper de son chien après une chirurgie

La clinique AniCura TRIOVet a réalisé une chirurgie pour traiter une hernie diaphragmatique. La durée de récupération est rapide. Ainsi, la plupart des chiens une respiration normale au moment du retour à la maison.



## A quoi s'attendre ?

- Nous espérons une **amélioration rapide** des signes cliniques s'étalant sur quelques jours avec un retour à la normale espéré en quelques semaines après la chirurgie.
- La plupart des animaux sont capables d'uriner sans aide particulière lorsqu'ils rentrent à la maison (**émission d'urine volontairement au moins une fois par jour**). Si cela n'était pas le cas, des consignes spécifiques vous seront données au moment du retour à la maison.
- La grande majorité des chiens ne présentent aucune difficulté pour déféquer bien que le **transit puisse prendre quelques jours avant de reprendre**.

## Niveau d'activité recommandé

- Les sauts, courses, jeux et montées/descente d'escaliers doivent être proscrites pendant au minimum une semaine. Éviter les surfaces glissantes et les escaliers qui peuvent générer une tension importante sur la plaie.
- Dans la plupart des cas, le meilleur moyen d'éviter tous ces mouvements est de confiner votre animal **dans une cage** de taille adaptée (ou une petite pièce pour les grands chiens) quand il est à la maison et de le garder en laisse courte lors des promenades.
- L'activité peut ensuite progressivement augmenter mais doit être discutée avec un vétérinaire au moment du retrait des sutures/agrafes afin d'adapter spécifiquement la démarche au besoin de votre chien.

## Traitement médical


La clinique AniCura TRIOVet vous délivrera une ordonnance indiquant tous les traitements nécessaires ainsi que la durée

## Gestion de la plaie chirurgicale

Si un pansement est en place sur la plaie au moment du retour à la maison, il doit être conservé aussi longtemps que possible. Si le pansement venait à se décoller, il n'est pas nécessaire d'en replacer un nouveau : finissez de le décoller et garder la plaie propre et sèche.

Si la plaie est découverte, surveillez-la au moins une fois par jour. Contactez la clinique AniCura TRIOVet ou votre vétérinaire traitant en cas d'anomalie.

Le port d'une collerette est **obligatoire pendant deux semaines** afin de limiter au maximum le risque de complications de plaie (infection, retard de cicatrisation...). Un léchage unique de la plaie peut mener à une infection.



### Visites de suivi

- Si votre chien est resté avec nous moins de 10-14 jours, des sutures ou agrafes seront toujours en place sur la plaie chirurgicale. Elles devront être retirées **2 semaines** après la date de la chirurgie. Cela peut être réalisé chez votre vétérinaire traitant habituel.
- Un rendez-vous de suivi toutes les 2 à 4 semaines est ensuite recommandé jusqu'à récupération complète ou stabilisation. Ces rendez-vous peuvent être réalisés chez votre vétérinaire traitant habituel ou à AniCura TRIOVet si besoin.
- La clinique AniCura TRIOVet à votre disposition pour toute question ou si vous ou votre vétérinaire souhaitez que nous réexaminions votre chien.