

S'occuper de son chien après une chirurgie au coude

La clinique AniCura TRIOVet a réalisé une chirurgie pour traiter une luxation du coude. Cette chirurgie implique de remettre en place le coude luxé et de le maintenir en place temporairement au moyen d'un fixateur externe articulé par des bandes élastiques. Le but est de maintenir le coude en position normale avec une liberté de mouvement normale le temps qu'un tissu cicatriciel se forme autour et le maintienne en place *ad vitam æternam*. Le fixateur externe doit être retiré après 10-14 jours.

La grande majorité des chiens se sentiront suffisamment bien pour faire de l'exercice. Il est de votre responsabilité de les en empêcher tout au long de la cicatrisation et jusqu'au feu vert d'un vétérinaire pour augmenter le niveau d'activité.

Activité

Aucune prothèse ne supporterait un exercice intense. Il est alors très important de **respecter les consignes de restriction d'activité** pendant la phase de cicatrisation :

- Le trot expose le membre opéré à des forces doubles et deux fois plus fréquentes que lors de la marche. Courir et sauter augmente les forces sur le membre opéré de 5 à 10 fois avec un risque accru d'échec des implants (fixateur)
- Eviter les surfaces glissantes et les escaliers qui peuvent générer un stress important sur la prothèse
- Dans la plupart des cas, le meilleur moyen d'éviter tous ces mouvements est de confiner votre animal **dans une cage** de taille adaptée (ou une petite pièce).
- L'activité peut ensuite progressivement augmenter mais doit être discutée avec un vétérinaire au moment du retrait des sutures/agrafes afin d'adapter spécifiquement la démarche au besoin de votre chien.

A quoi s'attendre ?

- Votre chien devrait avoir un niveau de confort satisfaisant dès que vous le récupérez. La plupart des chiens utilisent le membre opéré dans les 7-10 jours suivant la chirurgie.
- Nous espérons une **amélioration progressive** des signes cliniques s'étalant sur quelques semaines avec un retour à une démarche normale lors d'exercice normal espéré 3 mois après la chirurgie.
- La récupération fonctionnelle peut cependant parfois s'étaler sur une période plus longue et des séquelles peuvent parfois persister suite au développement irrémédiable d'arthrose.
- La plupart des animaux sont capables d'uriner sans aide particulière lorsqu'ils rentrent à la maison (24-48heure après leur retour au moins). La grande majorité des chiens ne présentent aucune difficulté pour déféquer bien que le **transit puisse prendre quelques jours (5-7 jours) avant de reprendre**.



Traitement médical

La clinique AniCura TRIOVet vous délivrera une ordonnance indiquant tous les traitements nécessaires ainsi que la durée

Gestion de la plaie chirurgicale et du fixateur externe

- Si un pansement est en place sur la plaie au moment du retour à la maison, il doit être conservé (propre) aussi longtemps que possible. Si le pansement venait à se décoller, il n'est pas nécessaire d'en replacer un nouveau : finissez de le décoller et **gardez la plaie propre et sèche**. Si la plaie est découverte, surveillez-la au moins une fois par jour. Contactez la clinique AniCura TRIOVet ou votre vétérinaire traitant en cas d'anomalie.
- Le port d'une collerette est **obligatoire** afin de limiter au maximum le risque de complications de plaie (infection, retard de cicatrisation...). Un léchage unique de la plaie peut mener à une infection.
- Surveillez quotidiennement le trajet des broches. En cas de suintement anormal, contactez un vétérinaire.

Visites de suivi

- Des sutures ou agrafes sont en place sur la plaie chirurgicale si la réduction de la luxation a nécessité une ouverture. Elles devront être retirées **2 semaines** après la date de la chirurgie. Cela peut être réalisé en même temps que le retrait du fixateur externe prévu à 10-14 jours après la chirurgie.
- Un rendez-vous de suivi 6 semaines après la chirurgie est nécessaire. Des radiographies pourront être réalisées sous sédation dans le but de contrôler la congruence articulaire. Veillez à amener votre animal à jeûn depuis la veille au soir le jour de ce contrôle.
- Des rendez-vous de suivi peuvent ensuite être recommandés toutes les 6-12 semaines, si nécessaire. La clinique AniCura TRIOVet reste à votre disposition pour toute question ou si vous ou votre vétérinaire souhaitez que nous réexaminions votre chien.

Complications possibles

Les complications les plus fréquemment décrites suite au traitement chirurgical d'une luxation du coude sont :

- Relaxation du coude. C'est une complication peu fréquente suite à cette technique bien qu'un exercice trop intense et/ou trop précoce y conduirait irrémédiablement. Une intervention chirurgicale avec renforcement des ligaments rompus peut alors être envisagée.
- Une infection post-opératoire. Le taux est faible et la plupart des infections guérissent suite à une antibiothérapie adaptée.
- Le développement d'un sérome est également possible, ce qui rétrocede sans traitement particulier en l'absence d'infection.
- Irritation nerveuse secondaire au traumatisme.
- Une arthrose secondaire au traumatisme et à la chirurgie se développera. Le traitement chirurgical ne stoppe malheureusement pas le processus et le développement d'arthrose devra être surveillé. Une supplémentation alimentaire en chondroprotecteurs (acides gras omega-3, glucosamine, chondroïtine sulfate) est conseillée.

