

S'occuper de sa chienne après une ovariectomie par laparoscopie

La clinique AniCura TRIOVet a réalisé une chirurgie pour stériliser votre chienne (ovariectomie). Cette chirurgie implique de retirer les deux ovaires avec l'aide d'une caméra. Une caméra a été introduite dans l'abdomen autour du nombril et un instrument a été utilisé en avant du nombril pour d'abord attraper l'ovaire puis coaguler les vaisseaux avant de les couper avec les attaches ligamentaires et utérines.

La grande majorité des chiennes se sentiront suffisamment bien pour faire de l'exercice dès le soir de l'intervention. Il est de votre responsabilité de les empêcher tout au long de la cicatrisation, c'est à dire 10 jours environ.

Activité

Il est très important de **respecter les consignes de restriction d'activité** pendant la phase de cicatrisation cutanée afin de limiter le risque de complications de plaie :

- Les sauts, courses, jeux et montées/descente d'escaliers doivent être proscrites pendant au minimum une semaine. Éviter les surfaces glissantes et les escaliers qui peuvent générer une tension importante sur la plaie.
- Dans la plupart des cas, le meilleur moyen d'éviter tous ces mouvements est de confiner votre animal **dans une cage** de taille adaptée (ou une petite pièce pour les grands chiens) quand il est à la maison et de le garder en laisse courte lors des promenades.
- L'activité peut progressivement augmenter à partir de la 2ème semaine pour revenir progressivement à la normale.

À quoi s'attendre ?

Votre chienne devrait avoir un niveau de confort satisfaisant dès que vous la récupérez. Une gêne peut éventuellement être rapportée au cours de la première semaine et devrait s'estomper seule.

La plupart des chiennes sont capables d'uriner sans aide particulière lorsqu'elles rentrent à la maison (24-48 heure après leur retour au moins). La grande majorité des chiennes ne présentent aucune difficulté pour déféquer bien que le **transit puisse prendre quelques jours (5-7 jours) avant de reprendre**.

Traitement médical

La clinique AniCura TRIOVet vous délivrera une ordonnance indiquant tous les traitements nécessaires ainsi que la durée

Gestion de la plaie chirurgicale

Les sutures sont résorbables et sous la peau. Elles se dégraderont seules et n'ont alors pas besoin d'être retirées.

Le port d'une collerette est **obligatoire pendant une semaine** afin de limiter au maximum le risque de complications de plaie (infection, retard de cicatrisation...). Un léchage unique de la plaie peut mener à une infection.

Visite de suivi

Aucune visite de suivi n'est nécessaire après ce type d'intervention. N'hésitez cependant pas à contacter la clinique AniCura TRIOVet en cas d'anomalie.

Alimentation

Une alimentation habituelle peut reprendre dès le soir de l'intervention.

