

# S'occuper de son chien après une castration

La clinique AniCura TRIOVet a réalisé une chirurgie pour stériliser votre chien mâle. Cette chirurgie implique de retirer les deux testicules par une incision en avant du scrotum.

La grande majorité des chiens se sentiront suffisamment bien pour faire de l'exercice dès le soir de l'intervention. Il est de votre responsabilité de les en empêcher tout au long de la cicatrisation, c'est à dire 10 jours environ.

## Activité

Il est très important de respecter les consignes de restriction d'activité pendant la phase de cicatrisation cutanée afin de limiter le risque de complications de plaie.

Les sauts, courses, jeux et montées/descente d'escaliers doivent être proscrites pendant au minimum une semaine. Eviter les surfaces glissantes et les escaliers qui peuvent générer une tension importante sur la plaie.

Dans la plupart des cas, le meilleur moyen d'éviter tous ces mouvements est de confiner votre animal dans une cage de taille adaptée (ou une petite pièce pour les grands chiens) quand il est à la maison et de le garder en laisse courte lors des promenades.

L'activité peut progressivement augmenter à partir de la 2ème semaine pour revenir progressivement à la normale.

Votre chien continuera d'émettre des spermatozoïdes pendant environ 5-7 jours après la chirurgie. Par sécurité, tout contact avec une chienne en chaleur est alors déconseillé pendant les 2 premières semaines suivant la chirurgie.

## A quoi s'attendre ?

Votre chien devrait avoir un niveau de confort satisfaisant dès que vous le récupérez. Une gêne peut éventuellement être rapportée au cours des 7-10 premiers jours et devrait s'estomper seule.

La plupart des animaux sont capables d'uriner sans aide particulière lorsqu'ils rentrent à la maison (24-48heures après leur retour au moins).

La grande majorité des chiens ne présentent aucune difficulté pour déféquer bien que le transit puisse prendre quelques jours (5-7 jours) avant de reprendre.

## Traitement médical

La clinique AniCura TRIOVet vous délivrera une ordonnance indiquant tous les traitements nécessaires ainsi que la durée.

## Gestion de la plaie chirurgicale

Les sutures sont résorbables et sous la peau. Elles se dégraderont seules et n'ont alors pas besoin d'être retirées.

Le port d'une collerette est obligatoire pendant une semaine afin de limiter au maximum le risque de complications de plaie (infection, retard de cicatrisation...). Un léchage unique de la plaie peut mener à une infection.

## Alimentation

Une alimentation habituelle peut reprendre dès le soir de l'intervention.

